



Zalecenia przed i po zabiegu na przepuklinę

Przed zabiegiem

- Należy wykonać następujące badania:
 - morfologia
 - koagulogram
 - glukoza
 - jonogram
 - mocz b. ogólne
 - EKG
- Należy ogolić operowaną okolicę.
- W okresie **7 dni** przed zabiegiem proszę nie przyjmować żadnych preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (**aspiryna, akard**), **5 dni** przed zabiegiem proszę nie przyjmować preparatów zawierających **ibuprofen**.
- **Zabieg przy asyście anestezjologa** proszę pozostać na czczo 6 godzin przed zabiegiem a 4 godziny proszę nic nie pić.
- Dotyczy Kobiet- w przypadku zabiegu ze znieczuleniem anestezjologicznym paznokcie muszą być nie pomalowane
- **ZADATEK**
Prosimy o wpłacenie zadatku w wysokości 500 zł w celu rezerwacji terminu zabiegu.

KRIOCENTRUM S.C.

05-420 Józefów

ul. Wyszyńskiego 103

SWIFT WBKPPLPP 21 1090 2590 0000 0001 4203 2548

Po zabiegu

- Bezpośrednio po zabiegu i powrocie do domu zalecane jest leżenie.
- Chłodzenie operowanej okolicy i wyższe ułożenie genitaliów
- W następnych dniach można podjąć normalne czynności życiowe.
- Zalecane jest chodzenie.
- Unikanie wysiłku i czynności uruchamiających tłocznię brzuszną (spinięcie mięśni brzucha)
- Na zasinienia stosować żel Lioton 1000 lub Helason do nabycia w aptecce bez recepty

Józefów, ul. Wyszyńskiego 103; tel. 22 4230187 tel/fax: 22 7792821

www.kriocentrum.com ; repcja@kriocentrum.com

czynne: pn-pt: 8-20 sob: 9-14